



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

**ALD 6**

**HÉPATITE CHRONIQUE C**

LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS

# SOMMAIRE

---

<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>2</b>
<b>AVERTISSEMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>I. ACTES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX .....</b>	<b>4</b>
<b>II. BIOLOGIE.....</b>	<b>5</b>
<b>III. ACTES TECHNIQUES .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. TRAITEMENTS .....</b>	<b>6</b>

## **AVERTISSEMENT**

---

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a créé la Haute Autorité de santé et a précisé ses missions, notamment dans le domaine des affections de longue durée (article R161-71 du Code de la sécurité sociale).

En son article 6, elle modifie l'article L 322-3 du Code de la sécurité sociale qui définit les circonstances d'exonération du ticket modérateur pour l'assuré et l'article L 324-1 du même code qui précise les obligations en cas d'affection de longue durée, notamment celle d'établir un protocole de soins de façon conjointe, entre le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.

Conformément à ses missions, fixées par le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004, la Haute Autorité de santé formule des recommandations sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L 324-1 pour lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application du 3° de l'article L 322-3.

Ces recommandations portent le cas échéant sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation. La liste des actes et prestations qui suit pour l'hépatite C cible ainsi l'ensemble des prestations qui peuvent apparaître justifiées pour la prise en charge d'un malade en ALD, lors d'un suivi ambulatoire. Elle doit servir de base aux protocoles de soins pour les patients en ALD, en sachant que certaines situations particulières de complications faisant l'objet d'hospitalisation peuvent être à l'origine d'actes et de soins non listés ici.

## LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS

### I. ACTES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

Professionnels	Situations particulières
Hépatogastro-entérologue, infectiologue ou interniste	Initiation du traitement antiviral Echappement au traitement antiviral
Médecin généraliste, hépatogastro-entérologue, infectiologue ou interniste	Bilan initial Pendant le traitement antiviral Après le traitement antiviral, limité à 2 ans en cas de réponse virale prolongée et d'absence de fibrose sévère
Infirmier	Lorsque le patient ne peut s'injecter lui-même son traitement
Consultation spécialisée en alcoologie	Aide au sevrage si nécessaire
Consultation spécialisée en tabacologie ou spécialisée dans les addictions	Aide au sevrage si nécessaire
Ophthalmologue	Bilan initial si facteurs de risque Selon avis ophtalmologique
Psychiatre	Bilan initial si antécédents psychiatriques Selon avis psychiatrique
Avis d'autres spécialistes	En fonction des complications du traitement

**L'éducation thérapeutique** constitue une dimension de l'activité de certains professionnels. Elle doit veiller à l'implication du patient ayant une hépatite chronique C : intelligibilité de sa maladie, maîtrise des gestes techniques et adaptation du mode de vie. Elle comporte :

- une information, qui porte sur les thérapeutiques disponibles, les effets indésirables possibles du traitement reçu par le patient, la planification des examens de routine ou de dépistage de complications éventuelles et leurs résultats ;
- un apprentissage des gestes techniques (auto-injection si traitement par interféron) ;
- une aide à l'arrêt de la consommation d'alcool et de tabac, associée si besoin à un accompagnement spécialisé ;
- une prise en charge spécialisée est recommandée chez les personnes fortement dépendantes ou souffrant de coaddictions multiples ou présentant un terrain anxio-dépressif ;
- en cas d'excès de poids, une recherche de réduction pondérale, ainsi qu'une normalisation du bilan lipidique et de la glycémie, surtout s'il existe une stéatose hépatique associée.

Ces actions d'éducation requièrent le concours de différents professionnels de santé, qui peuvent intervenir au moyen d'actes individuels auprès des malades ou par une éducation de groupe. Ces actions peuvent exister aujourd'hui mais avec une organisation insuffisante, et sans que leur prise en charge ne soit toujours prévue. Une contractualisation globale autour de l'intervention des différents professionnels est préférable à la juxtaposition d'actes.

## II. BIOLOGIE

Examens	Situations particulières
Anticorps anti-VHC	Bilan initial : 2 sérologies sur 2 échantillons différents
Détection qualitative de l'ARN du VHC sérique	Bilan initial En fin de traitement et 24 semaines après son arrêt En cas de négativation, une nouvelle recherche peut être effectuée 12 à 24 mois après la fin du traitement
Quantification de l'ARN du VHC sérique	Bilan initial si décision de traitement A 4 semaines, sur avis spécialisé Pour génotypes 1, 4, 5 et 6 : - à 12 semaines de traitement - à 24 semaines si persistance virale à 12 semaines
Détermination du génotype viral	Bilan initial
Transaminases (ASAT, ALAT)	Bilan initial À 15 jours du début du traitement puis tous les mois pendant le traitement antiviral Tous les 2 mois pendant les 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement antiviral Surveillance, pour les patients non traités
Gamma-GT, phosphatases alcalines, bilirubine	Bilan initial
Hémogramme, y compris plaquettes	Bilan initial À 15 jours, puis tous les mois pendant le traitement
Uricémie	Pendant le traitement antiviral
Taux de prothrombine	Bilan initial Surveillance d'une cirrhose
Alphafœtoprotéine	Surveillance d'une cirrhose, d'un carcinome hépatocellulaire
Diagnostic biologique de grossesse	Bilan initial, si une grossesse est possible Pendant le traitement, si une grossesse est possible
Sérologies VIH, VHB (Ag HBs, Ac anti-HBs, Ac anti-HBc), anti-VHA (Ac IgG anti-VHA)	Bilan initial Si le patient a été vacciné contre le VHB, Ac anti-HBc sur avis spécialisé
Dosage de la TSH	Bilan initial Tous les 3 mois pendant le traitement par IFN alpha ou PEG et 6 mois après son arrêt
Auto-anticorps antithyroperoxydase d'auto-anticorps anti-nucléaires, anti-muscle lisse et anti-LKM1	Bilan initial
Créatininémie, protéinurie, clairance créatinine	Bilan initial
Glycémie	Bilan initial
Ferritinémie et mesure du coefficient de saturation de la transferrine	Bilan initial
Cholestérol total, HDL et triglycérides	Bilan initial
Cryoglobulinémie	Si manifestations symptomatiques de cryoglobulinémie
Examen anatomopathologique	Si PBH

## III. ACTES TECHNIQUES

Actes	Situations particulières
PBH avec établissement du score METAVIR	Bilan initial (non indispensable en cas de génotype 2 ou 3) Sur avis spécialisé
Échographie abdominale	Bilan initial Surveillance d'une cirrhose
Fibroscopie OGD	Si cirrhose
Transplantation hépatique	En cas de cirrhose sévère (CHILD C) En cas de carcinome hépatocellulaire (lésion unique $\leq 5$ cm ou $\leq 3$ nodules $\leq 3$ cm chacun)
ECG	Bilan initial, si patients de plus de 40 ans ou en cas de cardiopathie connue

## IV. TRAITEMENTS

Traitements pharmacologiques <sup>1</sup>	Situations particulières
<b>Traitements antiviraux</b>	
- IFN PEG $\alpha$ -2a ou IFN PEG $\alpha$ -2b + ribavirine	Traitement de référence : La durée du traitement (de 6 mois à 1 an) est à moduler en fonction du génotype, de la charge virale, de la tolérance, et de la présence de co-infection (par exemple avec le VIH)
- IFN PEG $\alpha$ -2a ou IFN PEG $\alpha$ -2b	En monothérapie, si contre-indication à la ribavirine
- IFN- $\alpha$ ou IFN PEG $\alpha$ -2a ou IFN PEG $\alpha$ -2b	En monothérapie en cas de primo-infection au VHC et/ou chez les patients dialysés
<b>Autres traitements pharmacologiques</b>	
Contraceptif oral	Si une grossesse est possible au cours du traitement par la ribavirine et dans les 6 mois suivant son arrêt
Substitut nicotinique	Aide au sevrage tabagique <b>(prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)</b>
Bupropion	Aide au sevrage tabagique, en deuxième intention <b>(prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)</b>
<b>Vaccinations</b>	
Vaccination VHA Vaccination VHB	Si nécessaire
<b>Dispositifs médicaux</b>	
Dispositifs contraceptifs	Si une grossesse est possible au cours du traitement par la ribavirine et dans les 6 mois suivant son arrêt Les hommes traités par la ribavirine et dans les 6 mois suivant son arrêt doivent être informés d'utiliser un préservatif

<sup>1</sup> Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s'assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d'une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM). Dans le cas d'une prescription hors AMM, celle-ci doit faire l'objet d'une information complémentaire spécifique pour le patient.